

# PATIENT CONTROLLED ANALGESIA - PCA [Analgesico controllato dal paziente]

DOPO IL TUO INTERVENTO POTRAI SUBIRE DEI DISTURBI E DEI DOLORI. QUESTO CARTELLINO SPIEGHERÀ COME AIUTARTI A TENERE QUEI DISTURBI O DOLORI SOTTO CONTROLLO.

## COS'È UN ANALGESICO CONTROLLATO DAL PAZIENTE (PCA)?



Utilizzando la fleboclisi al braccio per mezzo di questa macchina ti sarà somministrato un antidolorifico QUANDO NE HAI BISOGNO



## COME SI USA?




Quando cominci a sentire dolore devi premere questo pulsante UNA VOLTA SOLA.

Ti sarà allora somministrata una dose di antidolorifico stabilita.

Pronto per l'uso Somministrando il farmaco Non disponibile all'uso



## QUANDO DEVO USARLA?



Da usare quando il livello del dolore rientra in questo raggio.

QUANTE VOLTE POSSO USARLA?

- ✓ Ogni volta che senti un livello di dolore sgradevole
- ✓ Prima di fare qualsiasi forma di ginnastica che potrebbe portarti dolore
- ✓ Prima di cambiare una benda utilizzata dopo l'intervento
- ✓ POSSO SOMMINISTRARMI TROPPO FARMACO?

No, il medico ha ordinato che il farmaco sia somministrato in quantità appropriate per il tuo dolore. L'infermiera ha programmato la macchina a somministrarti solo un dato numero di dosi ogni ora quando premi il pulsante, in modo che non puoi ricevere una quantità di farmaco maggiore di quanto sia appropriato per te.

POSSO SVILUPPARE UNA DIPENDENZA PER IL FARMACO?

Quando gli antidolorifici vengono somministrati per alleviare il dolore il corpo accetta il sollievo dal dolore MA NON sviluppa una dipendenza da antidolorifico.

DOVRÒ RIMANERE A LETTO QUANDO USO LA PCA?

No, la macchina PCA sarà collegata ad un palo su rotelle in modo che potrai spostarti con il palo e la macchina.

PER QUANTO TEMPO POTRÒ USARE LA PCA?

Solo per il periodo in cui accusi dolori forti i quali sono una conseguenza del tuo intervento.

QUANTO VELOCE È LA PCA?

Il farmaco viene somministrato appena premi il pulsante, incomincerai a sentire gli effetti dell'antidolorifico in pochi minuti.

COSA DEVO FARE SE SENTO ANCORA DOLORE?

Se hai difficoltà ad utilizzare la macchina, o se accusi ancora dolori dopo aver usato la macchina sei pregato di parlarne con l'infermiera. Lei potrà:

- ✓ Fare un accertamento dei tuoi dolori insieme a te
- ✓ Aiutarti ad usare la macchina correttamente
- ✓ Procurarti dell'assistenza supplementare per la gestione dei tuoi dolori
- ✓ Contattare il tuo medico per ulteriore assistenza

LA PCA PORTA DEGLI EFFETTI COLLATERALI?

A volte gli individui subiscono effetti collaterali compresi:

- ✓ Nausea e vomito
- ✓ Sonnolenza
- ✓ Sudore
- ✓ Brutti sogni

Per tutti questi effetti collaterali esiste una soluzione perciò appena subisci uno di questi sei pregato di comunicarli all'infermiera.

Servizio interprete per individui con difficoltà di Lingua inglese

Se non capisci le informazioni contenute in questo cartellino riguardante l'uso della PCA, sei pregato di avvisare il personale che hai bisogno di un interprete e, ove possibile, qualcuno che parla la tua lingua sarà disponibile.